

Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang

In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik deelt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu mede dat de hiernavolgende erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen werden uitgebreid met een toepassing van gering belang.

Handelsbenaming	FLINT 50 WG
Erkenningsnummer	9144/B
Samenstelling	50 % TRIFLOXYSTROBINE
Toepassing van gering belang :	
Teelt	kersen- en kriekenbomen (<i>Prunus avium</i> et <i>P. cerasus</i>)

Veiligheidsstermijn	14 dagen
Ter bestrijding van	schurft
Toepassingswijze	0,1 kg/ha haag, 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Teelt	pruimenbomen (<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>domestica</i>)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	Max. 2 toepassingen/jaar
Ter bestrijding van	roest (steenfruit)
Toepassingswijze	0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	hagelschotziekte
Toepassingswijze	0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Ter bestrijding van	tak- en bloesemsterfte (<i>Monilinia</i>)
Toepassingswijze	0,1 kg/ha haag, 1-2 toepassingen met een interval van 10 dagen
Driftreducerende maatregelen	Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Handelsbenaming	PIRIMOR
Erkenningsnummer	6640/B
Samenstelling	50 % PIRIMICARB
Toepassing van gering belang :	
Teelt	wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht) (<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>tuberosum</i>)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	0,4 kg/ha, 1 toepassing
Teelt	dille (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (<i>Anethum graveolens</i>)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	0,4 kg/ha, 1 toepassing
Teelt	engelwortel (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (<i>Angelica sylvestris</i>)

Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	0,4 kg/ha, 1 toepassing
Teelt	koriander (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Coriandrum sativum)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	0,4 kg/ha, 1 toepassing
Teelt	lavas, maggiplant (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Levisticum officinale)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	bladluizen
Toepassingswijze	0,4 kg/ha, 1 toepassing
Handelsbenaming	VACCIPLANT
Erkenningsnummer	9661/B
Samenstelling	45 g/l LAMINARINE
Toepassing van gering belang :	
Teelt	courgette/patisson (open lucht) (Cucurbita pepo)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	echte meeldauw
Toepassingswijze	0,75 l/ha met een interval van 5-7 dagen, 1-6 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	/
Teelt	courgette/patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)
Veiligheidsstermijn	7 dagen
Opmerking	maximum 1 toepassing per jaar
Ter bestrijding van	echte meeldauw
Toepassingswijze	0,75 l/ha met een interval van 5-7 dagen, 1-6 toepassingen
Driftreducerende maatregelen	/
Handelsbenaming	GEYSER
Erkenningsnummer	8256/B
Samenstelling	250 g/l DIFENOCONAZOOL
Toepassing van gering belang :	
Teelt	dille (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Anethum graveolens)
Veiligheidsstermijn	14 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen per snede - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van	echte meeldauw
Toepassingswijze	0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Ter bestrijding van	alternaria
Toepassingswijze	0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Driftreducerende maatregelen	/
Teelt	lavas, maggiplant (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Levisticum officinale)
Veiligheidstermijn	14 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen per snede - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	echte meeldauw
Toepassingswijze	0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Ter bestrijding van	alternaria
Toepassingswijze	0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Driftreducerende maatregelen	/
Teelt	koriander (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Coriandrum sativum)
Veiligheidstermijn	14 dagen
Opmerking	- max. 2 toepassingen per snede - Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.
Ter bestrijding van	echte meeldauw
Toepassingswijze	0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Ter bestrijding van	alternaria
Toepassingswijze	0,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 14 dagen
Toepassingsstadium vijand	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen
Driftreducerende maatregelen	/

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schadegevallen of ongevallen die zouden voortvloeien uit de hierboven vermelde toepassingen. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gebruiker.